

DANTŲ IMPLANTACIJA – ką reikia žinoti po operacijos?

Pirmoji para

Grįžus namo po operacijos, venkite fizinio aktyvumo – daugiau laiko praleiskite sėdėdami, o gulėdami galvą laikykite aukštesnėje padėtyje. Taip pat neskalkaukite burnos ertmės, nevartokite kieto, karšto maisto/gėrimų, valgykite priešinga puse. Pasireiškus patinimui, naudokite ledo kompresą priglaudami jį prie žando maždaug 20 minučių su tokios pačios trukmės pertraukomis. Atsiradęs kraujavimas paprastai būna nestiprus, dažniausiai praeinantis po kelių valandų.

Vaistai ir kiti medikamentai

- ◆ Antibiotikai: nurodytą dozę reikia vartoti 7 dienas, 3–4 kartus per parą.
- ◆ Vaistai nuo skausmo: nurodytus vaistus reikia gerti 2–5 dienas, 2–3 kartus per parą.
- ◆ Kiti paskirti medikamentai vartojami pagal gydytojo rekomendacijas.

Pirmoji savaitė

Antrąją parą svarbu sugrįžti prie higienos – naudojant pastą ir minkštą šepetėlį 3 kartus per dieną valyti dantis, vėliau burną skalauti 0,2 % chlorheksidino tirpalu. Nuo trečiosios dienos tomis pačiomis priemonėmis naudojantis reikėtų valyti implantų galvutes (jeigu jos jau yra matomos), nepaisant negausaus dantenų kraujavimo.

Specialistai rekomenduoja rinktis minkštesnės konsistencijos maistą, vengti alkoholio, rūkymo (bent 2 savaites), fizinio aktyvumo. Praėjus 7–10 dienų, paprastai išimamos siūlės.

Pirmasis mėnuo

Prasidėjus antrajai savaitei, nebereikia vartoti vaistų, chlorheksidino tirpalo (jis pakeičiamas paprastu vandeniu), grįžtama prie standartinės burnos higienos. Be to, galima vėl rinktis įvairios konsistencijos maistą, tačiau kramtyti vis dar reikia priešinga puse.

Jeigu po procedūros pradėjote jaustis prastai, kreipkitės į mūsų kliniką.

